
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Контрактубекс

(Contractubex)



Регистрационный номер в РФ: П N015096/01
от 16.07.2010

Торговое название: Контрактубекс

Лекарственная форма: гель для наружного применения

Описание

Матовый гель от светло-желтого до светло-коричневого цвета с характерным запахом.

Состав: на 100 г геля

Активные вещества:

Экстракт луковиц лука репчатого жидкого	10 г
Гепарин натрия	0,04 г (5000 МЕ)
Аллантоин	1 г

Вспомогательные вещества:

Кислота сорбиновая	0,1 г
Метилпарагидроксибензоат	0,15 г
Камедь ксантановая (ксантурал 75)	2 г
Макрогол 200 (Полиэтиленгликоль 200)	25 г
Масло ароматизированное (аромат 231616)	0,3 г
Вода очищенная	61,41 г

Фармакотерапевтическая группа: D03AX.

Гиперрубцевания средство лечения.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Оказывает фибринолитическое противовоспалительное (за счет присутствия экстракта Сереа), антиромбическое (за счет присутствия гепарина) и кератолитическое (за счет присутствия аллантоина) действие. Стимулирует клеточную

регенерацию без гиперплазии. Ингибитирует пролиферацию келлоидных фибробластов.

Фармакокинетика:

В эксперименте было показано, что гепарин в течение 4 ч в клинически достаточном количестве проникает в соединительную ткань дермы. Глубокое проникновение обеспечивается комбинацией гепарина с экстрактом луковиц Сереа и аллантоином (трансэпидермальная гепаринизация).

При использовании препарата Контрактубекс системная абсорбция не наблюдается.

Показания к применению

- Гипертрофические и келоидные рубцы, возникающие после хирургических операций, ампутаций, ожогов и травм
 - Анкилозы (контрактуры) суставов
 - Контрактура Дюпюитрена
 - Травматические сухожильные контрактуры
 - Растижки после беременности
 - Атрофические рубцы (в частности, возникающие после аспе или фурункулеза)
 - Профилактика образования патологических рубцов в послеоперационном периоде или после несчастного случая
- Возможно применение у детей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

Способ применения и дозы

Наружно.

Расход препарата в одно применение в среднем 0,5 см геля на рубцовую поверхность площадью 20-25 см². Взрослым препарат наносят 2-3 раза в сутки, детям старше 1 года препарат наносят 1-2 раза в сутки. Гель наносят тонким слоем и слегка втирают в рубцовую ткань. Курс лечения при свежих рубцах (в том числе при

анкилозах (контрактурах) суставов, травматических сухожильных контрактурах, растяжках после беременности) составляет в среднем 4 недели. При застарелых плотных рубцах (в том числе при анкилозах (контрактурах) суставов, травматических сухожильных контрактурах, растяжках после беременности) на ночь накладывают окклюзионную повязку с гелем. Курс лечения составляет в среднем 3-6 месяцев. При контрактуре Дюпюирена курс лечения составляет в среднем 12 месяцев. Для профилактики используют фазу после эпителизации раны (на грануляции не наносят).

Побочное действие

Обычно Контрактубекс переносится очень хорошо, даже при длительном применении. Чаще всего отмечались кожные реакции в месте нанесения.

Классификация частоты возникновения побочных реакций: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$ до $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1000$ до $< 1/100$), редко ($\geq 1/10000$ до $< 1/1000$), очень редко ($< 1/10000$), частота не установлена (в настоящее время данные о распространенности побочных реакций отсутствуют).

Со стороны кожных покровов: часто: зуд, эритема, телеангиэктазия, атрофия рубца; нечасто: гиперpigментация кожи, атрофия кожи.

Также сообщалось о следующих спонтанных побочных реакциях:

Инфекционные заболевания: частота не установлена: пустулезные высыпания.

Со стороны иммунной системы: частота не установлена: гиперчувствительность (аллергические реакции).

Со стороны нервной системы: частота не установлена: парестезия.

Со стороны кожных покровов: частота не установлена: крапивница, сыпь, зуд, эритема, раздражение кожи, папулы, чувство жжения, чувство натяжения, контактный дерматит.

Общие расстройства и нарушения в месте нанесения: частота не установлена: отек, боль и шелушение в месте нанесения.

Зуд, который является проявлением естественных процессов при формировании рубца, обычно не требует прекращения применения препарата.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или отмечаются любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, следует немедленно сообщить об этом врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не описано.

Передозировка

Не описано.

Особые указания

Для усиления действия препарата наносить на предварительно распаренную кожу. Возможно его применение в сочетании с физиотерапевтическими мероприятиями.

При лечении свежих рубцов следует избегать ультрафиолетового облучения, воздействия холода и интенсивного массажа.

Действие препарата во время беременности, в период грудного вскармливания и у детей до 1 года не изучалось.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не влияет.

Форма выпуска

Гель для наружного применения по 20 или 50 г в тубу алюминиевую. Тубу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C в сухом месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

3 года.

6 месяцев с момента вскрытия тубы. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

"Мерц Фарма ГмбХ и Ко. КГА" D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне

Претензии направлять по адресу:

ООО "Мерц Фарма"
123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10,
БЦ «Башня на Набережной», блок С.
телефон: (495) 653-8555
www.merz.ru

